

Belimumab (Benlysta®)

Belimumab is een medicijn dat de werking van B-cellen in het immuunsysteem beïnvloedt. B-cellen spelen een belangrijke rol in ontstekingsprocessen (zoals gewrichtsontsteking) bij verschillende reumatologische aandoeningen.

Hoe dit geneesmiddel wordt toegediend

Belimumab wordt via het infuus toegediend op het dagcentrum van het UMCG.

Er wordt gestart met een opbouwschema. De eerste drie infusen worden eens per twee weken toegediend, vervolgens komt u eens per vier weken. Tijdens de eerste twee infusen bent u in ieder geval 6,5 uren op het dagcentrum. Als u deze infusen goed verdraagt bent u vanaf het derde infuus ongeveer 2,5 uren op het dagcentrum.

Na het infuus mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Reden hiervoor is dat u voorafgaand aan Belimumab het medicijn clemastine krijgt toegediend, dit beïnvloedt uw rijvaardigheid.

Moment van werking

U merkt waarschijnlijk niet meteen het effect van Belimumab, dit kan een aantal weken duren. U bespreekt op de polikliniek met uw behandelaar of het medicijn het gewenste effect heeft. U heeft ongeveer drie tot vier maanden na het starten van het biological een eerste afspraak hierover op de polikliniek.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de behandelaar aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelaar of apotheker.

Specifieke bijwerking

Om allergische reacties te voorkomen krijgt u voorafgaand aan ieder infuus medicatie toegediend (paracetamol en clemastine). Het gaat hierbij om allergische reacties zoals u kunt lezen onder het kopje 'bijwerkingen' in de folder 'Biologicals, wat moet u weten?' Allergische reacties vinden vrijwel altijd plaats wanneer u nog op het dagcentrum bent, maar kunnen in zeldzame gevallen in de dagen tot weken na het infuus nog optreden.

Naast de algemene bijwerkingen zoals u die heeft gelezen in de folder 'Biologicals, wat moet u weten?' komen de volgende bijwerkingen ook regelmatig voor, misselijkheid en diarree.

Indien deze bijwerkingen zo ernstig zijn dat het dagelijks leven beïnvloedt neem dan contact op met de verpleegkundig specialist of uw behandelaar.