

**REUMATOLOGEN NOORD-NEDERLAND
BEHANDELING MET IMMUNOMODULERENDE EN IMMUNOSUPPRESSIEVE
GENEESMIDDELEN**

**INFORMATIE VOOR PATIËNTEN
CICLOSPORINE (Neoral®)**

Ciclosporine behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. het beperken van de beschadiging door uw reumatische/auto-immuun ziekte
2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

Hoe u dit geneesmiddel het beste in kunt nemen

De totale dagdosis dient verdeeld over twee doses ingenomen te worden. De capsules heel doorslikken. De drank steeds verdunnen met bijvoorbeeld melk of vruchtensap (geen grapefruitsap) in een glas (niet in een plastic beker) en, na goed roeren, direct opdrinken. Het glas daarna nog eens met wat vloeistof naspoelen zodat de gehele dosis wordt ingenomen.

Moment van werking

Na het starten met Ciclosporine duurt het minimaal 8-12 weken voordat u enige verbetering van uw klachten bemerkt. Uw arts zal u mogelijk adviseren daarnaast andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog, verpleegkundig specialist of apotheker.

Als bijwerkingen zijn o.a. beschreven:

- hoge bloeddruk
- achteruitgang van de nierfunctie

Beide bijverschijnselen verdwijnen meestal na verminderen van de dosis of (tijdelijk) staken van het geneesmiddel. Soms moet de hoge bloeddruk behandeld worden met medicijnen.

- verhoogde cholesterolgehalte
- overmatige haargroei
- zwelling tandvlees
- misselijkheid, braken
- trillen van handen
- spierkrampen
- leverfunctiestoornissen
- hoofdpijn
- vocht vasthouden
- zeer zeldzame bijwerkingen: ernstig verlopende (virale) infecties, mogelijk met fatale afloop

Controles

Om in een vroeg stadium (dus voor er klachten zijn) eventuele bijwerkingen te kunnen opsporen vinden er regelmatig bloedcontroles plaats, en zal de bloeddruk worden gecontroleerd door de huisarts: de eerste drie maanden 1x/maand, daarna 1x/2maand. Indien een van bovenstaande verschijnselen zich voordoet kunt u het beste uw behandelend arts op de hoogte stellen.

Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed en de bloeddruk te laten controleren, krijgt u het dringend advies om geen Ciclosporine te gebruiken.

Aanvullende informatie

Ciclosporine kan in enkele gevallen **niet** worden gecombineerd met andere medicijnen. Indien uw huisarts of andere specialist het nodig vindt dat u medicijnen moet gebruiken, informeer deze dan altijd over uw behandeling met Ciclosporine.

Zwangerschap en borstvoeding

Indien een zwangerschap wordt overwogen is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken.

Borstvoeding is **niet** toegestaan tijdens het gebruik van Ciclosporine.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met Ciclosporine.

Vaccinaties

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen.

Wanneer u vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met uw behandeld reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u door naar de GGD.

Bron:

- Farmacotherapeutisch Kompas 2016
- Richtlijn Ciclosporine NVR 2004