

**REUMATOLOGEN NOORD-NEDERLAND
RICHTLIJNEN BEHANDELING MET IMMUNOMODULERENDE EN
IMMUUNSUPPRESSIEVE GENEESMIDDELEN**

HYDROXYCHLOROQUINE (Plaquenil®)

Hydroxychloroquine behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. het beperken van de beschadiging door de een auto-immuun/inflammatoire aandoening
2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

NB: Het therapeutisch effect van hydroxychloroquine kan niet binnen 3 - 6 maanden worden verwacht.

Datum: __ / __ / ____

Geachte collega,

Op de polikliniek Reumatologie/Klinische Immunologie zag ik uw patiënt(e) Dhr./Mevr.
....., geb __ / __ / ____ wegens reumatoïde artritis / SLE / M. Sjögren....

Uw patiënt(e) zal behandeld worden met Hydroxychloroquine.

Preparaat

Hydroxychloroquine (Plaquenil®), tabletten à 200 mg

Dosering

Twee tabletten à 200 mg per dag. Het eventueel optreden van anorexie, misselijkheid en maagklachten kan vaak worden tegengegaan door het geneesmiddel tijdens of na de maaltijd in te nemen.

Als bijwerking zijn o.a. beschreven

- Anorexie, gastro-intestinale klachten
- Retinopathie met veranderingen in pigmentatie en gezichtsveldsdefecten
- Huiduitslag, fotosensibilisatie
- Neuro- en cardiomyopathie, E.C.G.-veranderingen
- Beenmergsuppressie
- Psychose

Controles

Wegens bovengenoemde kans op retinopathieën is controle door de oogarts gewenst. Oogheelkundig onderzoek is geïndiceerd binnen 1 jaar na start van de behandeling en daarna periodiek.

Bij de eerste tekenen van retinopathie (bv. verstoring van gezichtsscherpte, kleurenzien) de behandeling onmiddellijk staken.

Melden bijwerkingen

Het is belangrijk dat er melding gemaakt wordt van mogelijke nieuwe bijwerkingen. Mochten er klachten ontstaan na de start van of tijdens het gebruik van Hydroxychloroquine verzoeken wij u de behandelend reumatoloog daarvan op de hoogte te stellen.

Instructies patiënt

Uw patiënt heeft ook informatie gekregen over de bijwerkingen en risico's van het gebruik van Hydroxychloroquine. Het advies is bij twijfel contact op te nemen met de huisarts, verpleegkundig specialist of reumatoloog.

Augustus 2016

Vaccinatie

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer uw patiënt in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, kunt u de patiënt het advies geven om te overleggen met de behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen de patiënt door naar de GGD.

Voor overleg kunt u bellen met de dienstdoende reumatoloog

Met vriendelijke groeten,

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie,
UMC Groningen

Bron

- Farmacotherapeutisch Kompas 2016
- Screening (Hydroxy)chloroquine Retinopathie, Richtlijn Afdeling Oogheelkunde UMCG 2011