

**REUMATOLOGEN NOORD-NEDERLAND
RICHTLIJNEN BEHANDELING MET IMMUNOMODULERENDE EN
IMMUUNSUPPRESSIEVE GENEESMIDDELEN**

SULFASALAZINE (Salazopyrine®)

Sulfasalazine behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze middelen in staat zijn de activiteit van het immunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. het beperken van de (gewrichts)beschadiging door een auto-immuun/inflammatoire aandoening
2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

NB: Het therapeutisch effect van Sulfasalazine kan niet binnen 4 - 10 weken worden verwacht.

Datum: __ / __ / ____

Geachte Collega,

Op de polikliniek Reumatologie/Klinische Immunologie zag ik uw patiënt(e) Dhr./Mevr., geboren __ / __ / ____ , wegens reumatoïde artritis / artritis psoriatica / M. Bechterew.

Uw patiënt(e) zal behandeld worden met Sulfasalazine.

Preparaat

Sulfasalazine (enteric coated) à 500 mg EC.

Dosering

- 1^e week 1000 mg dd
- 2^e week 1500 mg dd
- 3^e week en verder 2000 mg dd

Bij onvoldoende resultaat na 2 maanden kan de dosering eventueel opgehoogd worden tot 3000 mg per dag.

Om bijverschijnselen (intolerantie) te voorkomen kunnen de tabletten het beste tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Als bijwerking zijn o.a. beschreven

- misselijkheid, verminderde eetlust
- hoofdpijn
- temperatuursverhoging
- anemie, leukopenie, trombopenie, in zeldzame gevallen agranulocytose vooral in het begin van de behandeling
- huidafwijkingen, stomatitis
- hepatitis
- hematurie, proteïnurie
- voor mannelijke patiënten is een tijdelijke afname van de vruchtbaarheid beschreven
- allergische reactie

Controles

In verband met mogelijke bijwerkingen is het noodzakelijk regelmatig bloed te laten controleren. Het schema hiervoor is: Hb, leukocyten, trombocyten, ALAT, creatinine

- de eerste 3 maanden: 1x / 2 weken
- na 3 maanden: 1x / 3 maanden

Augustus 2016

Bij dalende tendens leukocytengetal graag overleg. Een ALAT waarde tot 3x de normaalwaarde kan worden geaccepteerd. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze controles te verzorgen?

Bij afwijkende bevindingen gaarne overleg.

Melden bijwerkingen

Het is belangrijk dat er melding gemaakt wordt van mogelijke nieuwe bijwerkingen. Mochten er klachten ontstaan na de start van of tijdens het gebruik van Sulfasalazine verzoeken wij u de behandelend reumatoloog daarvan op de hoogte te stellen.

Instructies patiënt

Uw patiënt heeft ook informatie gekregen over de bijwerkingen en risico's van het gebruik van Sulfasalazine. Het advies is bij twijfel contact op te nemen met de huisarts, verpleegkundig specialist of reumatoloog.

Vaccinatie

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer uw patiënt in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, kunt u de patiënt het advies geven om te overleggen met de behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen de patiënt door naar de GGD.

Voor overleg kunt u bellen met de dienstdoende reumatoloog.

Met vriendelijke groeten,

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie,
UMC Groningen

Bron:

- Farmacotherapeutisch Kompas 2016
- NVR richtlijn Sulfasalazine 2002
- DREAM 2007